



# Enquête Impact psychologique du frottis anormal

#### Méthodologie

#### L'enquête a été menée dans 4 pays :

- Espagne
- Portugal
- Italie
- France

En Espagne, au Portugal et en France les questionnaires ont été remis directement aux patientes par le médecin


En Italie, les patientes ont complété le questionnaire sur Internet

Nombre total de questionnaires par pays:

Espagne: 467
Portugal: 243
Italie 56
France 765


Résultats: alors qu'il est fréquent en France de recevoir un courrier, en Espagne, en Italie ou au Portugal, le médecin appelle les patientes au téléphone

Question: Comment avez-vous été informée du résultat «anormal» de votre frottis ?




La plupart des femmes font face à un certain niveau d'anxiété, de stress ou même de panique face à un résultat anormal et ressentent le besoin d'être mieux informées

Question: Quelle a été votre première pensée lorsque vous avez reçu vos résultats de frottis anormaux ? (Plusieurs réponses possibles)




# Les explications du médecin tendent à rassurer mais la plupart des patientes demeurent inquiètes.

Question: Une fois que votre médecin vous a expliqué ce que signifiait le diagnostic et qu'il vous a informée sur les étapes à venir, qu'avez-vous ressenti? Vous êtes vous sentie... (Plusieurs réponses possibles)




La plupart des femmes parlent de leur résultat. Très souvent le partenaire est impliqué.

Question: Une fois que votre médecin vous a donné les résultats et / ou vous a prescrit votre traitement, avez-vous parlé de votre maladie avec quelqu'un d'autre ? (Plusieurs réponses possibles)




Le degré de satisfaction face au support psychologique apporté par le médecin est plus élevé au Portugal et en Espagne

Question: En ce qui concerne votre relation avec votre médecin, sur une échelle de 1 à 10, à combien estimeriez-vous le soutien psychologique que vous avez reçu de la part de votre médecin pendant cette visite ? (où 1 signifie que vous vous êtes sentie extrêmement seule et 10 que vous vous êtes sentie parfaitement bien soutenue par votre médecin)




#### **Traitement**

Question: Quel traitement avez vous reçu ? (Plusieurs réponses possibles)



#### Durée du traitement : entre inquiétude et confiance...


Question: Comment avez-vous géré votre traitement ou votre attente ? (Plusieurs réponses possibles)




#### Impact et poids de la maladie Impact maximal dans la **relation avec le partenaire**

Question: Votre maladie a-t-elle un impact sur (où 1 signifie que vous ne vous sentiez pas du tout affectée et 10 au contraire très sévèrement affectée)






#### **Soutien reçu de votre partenaire**(on a scale from 0 to 10) La plupart des femmes se sentent parfaitement soutenues par leur partenaire




Le sentiment d'être informé est plus élevé au Portugal qu'en Espagne et enfin qu'en France. Les patientes ont le sentiment d'être mieux informées sur la maladie et les traitements.

Question: Plus précisément, sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que vous étiez bien informée sur (où 1 signifie pas informée du tout et 10 très bien informée)




La plupart des femmes reçoivent une information de la part de leur médecin. **Internet** n'est que la deuxième source d'information citée

Question: Où avez-vous obtenu des informations?




#### Le besoin d'information se fait clairement sentir!

Question: Souhaiteriez-vous avoir plus d'information sur le cancer du col de l'utérus et les autres maladies génitales dues aux papillomavirus et sur le moyen de les prévenir ?



Les médecins sont considérés comme la source d'information la plus importante et la plus crédible, mais il ne faut pas minorer les autres sources d'information.

Question: Quelles seraient selon vous les sources d'information les plus utiles ?



## Caractéristiques démographiques des participantes

	% patientes				
	Total	France A	Espagne B	Portugal C	
	(N=1475)	(N=765)	(N=467)	(N=243)	
Age (années)					
< 30	26.6	34.9 <sup>C</sup> *	28.6 <sup>C</sup>	16.3	
30 à 39	37.9	35.9	35.7	42.2	
40 à 49	22.3	19.1	23.8	23.9	
50 à 59	8.9	7.6	7.5	11.7	
≥60	2.7	2.2	1.5	4.2	
Données manquantes	1.6	0.3	$2.9^{A}$	1.7	
Statut marital					
Mariée/en concubinage	55.2	57.6	50	59.3	
Célibataire	32.3	33.3 <sup>°</sup>	$38.2^{\mathrm{C}}$	24.1	
Divorcée	10.3	8.3	10.3	12.5	
Veuve	2.2	0.8	1.5	$4.1^{A}$	
Nombre d'enfants					
0	16.4	30.7 <sup>C</sup>	10.4 <sup>C</sup>	8.4	
1	26.1	22.5	22.1	33.3	
2	23.5	16.6	23.1	$30.9^{A}$	
>2	11.4	9.7	12.0	12.6	
Données manquantes	22.6	20.5	$32.4A^{C}$	14.8	

Gynécologie Obstétrique & Fertilité, 2011, à paraître BMC Womens Health. 2011 May 25;11:18

### Frottis anormal: communication, réaction, suivi

		% patientes			
	Total	France	Espagne	Portugal	
		A	$\mathbf{B}$	C	
	(N=1475)	(N=765)	(N=467)	(N=243)	
Moyen de l'annonce				_	
Lettre (sous-total)	36.0	58.9 <sup>BC</sup>	12.7	36.3 <sup>B</sup>	
Du médecin	22.1	$33.6^{B}$	9.2	$23.5^{B}$	
Du laboratoire ± médecin	13.9	25.3 <sup>BC</sup>	3.5	12.8 <sup>B</sup>	
Téléphone (Sous-total)	52.0	31.9	75.7 <sup>AC</sup>	48.4 <sup>A</sup>	
Du médecin	24.2	23.4	22.3	26.9	
Du secrétariat médical	27.8	8.5	53.4 <sup>AC</sup>	$21.5^{A}$	
Autre	13.7	10.6	14.0	16.6	
Premières reactions à l'annonce du fi	rottis anormal*				
Anxiété	59.1	$74.0^{B}$	36.4	$66.9^{B}$	
Panique	32.9	29.1	25.6	43.9 <sup>AB</sup>	
Stress	23.3	38.6 <sup>BC</sup>	7.6	$23.9^{B}$	
Incompréhension	22.9	25.1	29.9 <sup>c</sup>	13.8	
Colère	8.4	7.6 <sup>c</sup>	15.6 <sup>AC</sup>	2.0	
Incrédulité	9.9	4.5	17.8 <sup>AC</sup>	7.5	
Culpabilité	8.6	8.4	11.9 <sup>C</sup>	5.4	
Autre	6.3	4.9	7.8	6.3	
Réactions après explication par le medecin des conclusions et des suites à envisager*					
Inquiétude	51.5	47.3	56A	51.2	
Réassurance	33.9	34.5	30.7	36.4	
Confiance	19.2	19.3C	7.3	31.0 <sup>AB</sup>	
Désarroi	13.7	18.5BC	12.5	9.9	
Optimisme	17.7	9.8BC	19.9	23.5	
Soulagement	14.5	11.6	14.9	16.9	
Dépression	11.8	15.7C	13C	6.6	
Autre	4.3	7.1B	1.5	4.1	

Gynécologie Obstétrique & Fertilité, 2011, à paraître BMC Womens Health. 2011 May 25;11:18

### Impact de la maladie sur différents aspects de la vie

e Espagne B 5) (N=467)	C
5) (N=467)	(N=243)
1) 2.6 (2.5)	$3.8(2.7)^{AB}$
3) 2.4 (2.5)	3.1 (2.5)
7) 3.1 (2.7)	3.6 (2.6)
9) 3.9 (3.1)	4.1 (2.9)
7	7) 3.1 (2.7)

# Diagnostic, sentiments des patientes vis-à-vis des traitements, et impact sur la qualité d<u>e vie</u>

	% patientes				
	Total	France A	Espagne B	Portugal C	
	(N=1475)	(N=765)	(N=467)	(N=243)	
Diagnostic anormal					
CIN1	28.4	16.6	39.7 <sup>A</sup>	28.9 <sup>A</sup>	
CIN2/3	25.4	16.2	$29.8^{A}$	$30.2^{A}$	
Sans gravité / nécessitant une surveillance	24.8	34.6 <sup>BC</sup>	16.2	23.7	
Cancer du col	4.7	2.6	3.3	8.2 <sup>A</sup>	
Autre	14.4	22.8 <sup>BC</sup>	13.2	7.3	
Prise en charge de la maladie*					
Colposcopie	49.5	$70.7^{BC}$	35.6	42.1	
Biopsie	42.0	32.1	44.4 <sup>A</sup>	49.6 <sup>A</sup>	
Frottis de contrôle à 6 mois	31.6	26.2	44.2 <sup>AC</sup>	24.4	
Conisation	30.0	20.0	$38.0^{A}$	$31.8^{A}$	
Test HPV	22.7	22.4	29.5 <sup>AC</sup>	16.1	
Frottis de contrôle à 1 an	9.7	8.9	11.7	8.7	
Autre	9.3	8.9	8.6	10.3	
Hystérectomie	2.1	0.8	$2.6^{A}$	2.9	
Ne savent pas	3.1	3.4	2.2	3.7	
Sentiments vis-à-vis du traitement ou de l'atetnte**					
Inquiétude	55.9	50.0	53.9	63.9 <sup>A</sup>	
Confiance (réassurance)	33.8	31.3	34.2	35.7	
Intégrité physique menacée	15.7	21.8 <sup>BC</sup>	14.7	10.5	
Dépression	10.9	10.4	10.5	11.8	
Désarroi	12.0	16.7 <sup>c</sup>	13.4 <sup>c</sup>	5.9	
Honte	2.1	3.2	2.2	0.8	
Solitude	5.5	10.9 <sup>BC</sup>	4.4	1.3	

# Information sur le traitement et conséquences de la maladie

	Total	France A	Espagne B	Portugal C	
	(N=1475)	(N=765)	(N=467)	(N=243)	
Bien informées*	Score moyen (DS)				
Maladie	5.9 (3.2)	4.8 (3.0)	$6.2(3.4)^{A}$	$7.0(2.8)^{A}$	
Traitements	5.9 (3.3)	4.6 (3.0)	$6.1 (3.4)^{A}$	$7.0(2.7)^{AB}$	
Conséquences affectives		3.1 (2.7)		$6.5(2.8)^{AB}$	
Conséquences sur la relation avec le partenaire	5.0 (3.3)	3.4 (2.8)	5.4 (3.5) <sup>A</sup>	6.3 (3.0) <sup>AB</sup>	
Conséquences sur la vie de famille	4.9 (3.3)	3.1 (2.8)	$5.2(3.5)^{A}$	$6.5(3.0)^{AB}$	
Conséquences on la maternité (fertilité)		3.6 (3.1)		6.6 (3.1) <sup>AB</sup>	
Source d'information **			%		
Médecin	79.6	67.4	85.4 <sup>A</sup>	85.9 <sup>A</sup>	
Internet	38.1	45.9 <sup>B</sup>	33.8	34.7	
Médias	14.6	23.1 <sup>BC</sup>	11.8	8.9	
Amis	14.0	$21.1^{BC}$	10.5	10.3	
Famille	10.5	13.9 <sup>BC</sup>	7.2	10.3	
Autre	6.5	8.3	4.8	6.6	
Meilleures sources potentielles d'information ***			%		
Médecin	79.0	77.0	72.7	87.4 <sup>AB</sup>	
Site Internet	40.9	49.7 <sup>B</sup>	31.9	41.2	
Lettre d'information	23.6	31.0°	29.4 <sup>°</sup>	10.3	
Médias / TV	20.0	$27.6^{B}$	7.6	$24.8^{B}$	
Groupe de parole	9.7	9.8	11.3	7.9	
Autre	1.4	1.6	1.6	0.9	